



Hur gick det för de alkoholskadade barnen?

FASD

Fetal Alcohol Spectrum Disorders

Fysiska, beteendemässiga och kognitiva effekter som kan bli följderna av alkoholexponering under fostertiden

**Canadian
Medical
Association
Journal**

**Journal de
l'Association
médicale
canadienne**



July 15, 1981 • Vol. 125, No. 2



Fetal alcohol syndrome:
a risk of alcohol abuse

Beteendeproblem och nedsatt kognitiv funktion FASD

kontrollera uppmärksamhet
social förmåga
intellektuell förmåga
minnes- inlärningssvårigheter
impulskontroll

barnen svårt i skolan



79 vuxna med FAS-diagnos 18 – 47 år

81% växte upp i familjehem
nu ensamstående, hos föräldrar, några
med familj och barn

13 år i skola – ofta särskola

halva gruppen har arbete

31% förtidspensionerade

ångest, depression



33% psykiatrisk vård

dricker inte alkohol

45% sömnmedicin

ångestdämpande

varit mobbade

nedsatta kognitiva funktioner

svårt förstå vardagsekonomin

svårt planera vardagen



Hur gick det för de alkoholskadade barnen?

Onödigt dåligt

Förändring i samhället?

Att fler visste vad FAS är – gäller socialtjänst, vård- och omsorgspersonal

Slippa förklara för läkaren vad FAS är

Att ingen gravid kvinna dricker en enda droppe alkohol



DRICK EJ
ALKOHOL
NÄR DU
MAREN BÄBISS I
MAGEN